



MASTIJET

Propriétés :

MASTIJET est une pommade intramammaire à utiliser chez la vache en lactation. La combinaison des antibiotiques utilisés dans MASTIJET assure une activité à large spectre couvrant toutes les bactéries communément rencontrées dans les mammites. La prednisolone diminue les réactions inflammatoires, favorise la diminution du comptage cellulaire somatique et un retour rapide à la production de lait.

Composition :

Chaque applicateur de 8 g contient :

Tétracycline (s.f chlorhydrate)	200 mg
Néomycine base (s.f sulfate)	250 mg
Bacitracine	2000 UI
Prédnisolone	10 mg
Excipient q.s.q un applicateur de	8 ml

Indications :

Affections mammaires à germes sensibles à la tétracycline, néomycine, bacitracine chez les vaches en lactation.

Posologie :

Administrer MASTIJET à raison d'un applicateur toutes les 12 heures, pendant 48 heures (4 traites de suite).

Mode d'administration :

Voie intramammaire

- Traire à fond la mamelle
- Bien désinfecter le trayon et son orifice
- Injecter la totalité d'un applicateur

Temps d'attente :

Lait : 8 traites (4 jours).

Animaux de boucherie : 30 jours

Conservation :

Conserver à une température comprise entre +15°C et + 25°C

NE PAS FAIRE AVALER
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USAGE VETERINAIRE

Présentations :

Boîtes de 4 et 20 applicateurs.

