



EQUILIS PREQUENZA TE

Propriétés :

Equilis Prequenza Te est un vaccin sous unitaire indiqué contre la grippe équine. L'antigène hémagglutinine, des souches immunogènes du virus vaccinal, présente la propriété de stimulateur active de l'immunité contre l'Influenza équine.

Le choix et la mise à jour des souches virales de la grippe équine (A/equi-1/Prague/1/56, A/equi-2/ Newmarket/1/93, A/equi-2/Newmarket/2/93), en fonction de l'apparition des nouveaux variant, a été fait suivant les recommandations de l'OIE (Office International des Epizooties) et l'WHO (Organisation mondiale de la Santé).

Ce vaccin intègre en plus l'anatoxine tétanique, offrant la possibilité de vacciner contre Clostridium tetani, agent responsable du tétanos du cheval, et minimisant par la suite l'intervention sur les animaux.

L'adjuvant exclusif d'Equilis Prequenza Te (ISCOM-MATRIX) permet de stimuler à la fois l'immunité humorale et cellulaire. Après injection, la matrice et les antigènes (HA) sont rapidement transportés vers les nœuds lymphatiques, ne créant pas de dépôts au niveau musculaire. Ils y stimulent les TH-1 (à l'origine de l'immunité cellulaire) et les TH-2 (immunité à l'origine de l'humorale).

L'immunité conférée contre la grippe est de 12 mois après la primo vaccination et de 24 mois contre le tétanos.

Compositions

A/équine -1/Prague/1/56	100 UA*
A/équine-2/Newmarket/1/93	50 UA
A/équine-2/Newmarket/2/93	50 UA
Anatoxine tétanique	40EF**

*UA : Unités antigéniques

**EF : Equivalent de la Flocculation

Adjuvant

Saponine purifiée	375 µg
Cholestérol	125 µg
Phosphatidylcholine	62,5 µg

Indications :

Pour les chevaux à partir de 6 mois

Immunsation active contre la grippe équine afin de réduire les signes cliniques et l'extraction virale après infection. Immunsation active contre le tétanos afin de prévenir la mortalité.

Grippe :

Mise en place de l'immunité	2 semaines après le protocole de primovaccination
Durée de l'immunité	5 mois après le protocole de primovaccination. 12 mois après le rappel

Tétanos :

Mise en place de l'immunité	2 semaines après le protocole de primovaccination
Durée de l'immunité	17 mois après le protocole de primovaccination. 24 mois après le 1 ^{er} rappel.

Posologie :

Voie intramusculaire





EQUILIS PREQUENZA TE

Mode d'administration :

Equins : une dose (1 ml), selon le protocole suivant
Programme vaccinal :

Primo vaccination :

- 1^{er} injection à partir de 6 mois
- 2^{ème} injection 4 semaines plus tard


Rappel

Grippe

- Le 1^{er} rappel (3e dose) contre la grippe équine est effectué 5 mois après le protocole de primovaccination. Ce rappel induit une immunité contre la grippe équine qui dure au moins 12 mois.
- Le 2^{ème} rappel est effectué 12 mois après le premier rappel.
- L'utilisation alternée, à 12 mois d'intervalle, d'un vaccin approprié contre la grippe équine, contenant les souches A/équine-1/Prague/1/56, A/équine-2/Newmarket/1/93, A/équine-2/Newmarket/2/93 est recommandé afin d'assurer le maintien des niveaux d'immunité vis-à-vis de la grippe (voir schéma)

Tétanos

- Le 1^{er} rappel est effectué au plus tard 17 mois après le protocole de primovaccination. Ensuite un intervalle maximal de 2 ans est recommandé (voir schéma).



En cas de risque d'infection élevé ou de prise colostrale, une injection initiale supplémentaire peut être ordonné à l'âge de 4 mois, suivie d'un protocole de vaccination complet (vaccination à l'âge de 6 mois et 4 semaines plus tard).

Conservation :

Conserver entre +2 à +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

Précautions :

- Précautions particulières d'emploi :
- Laisser le vaccin atteindre la température ambiante (15 °C-25 °C)
- Administrer une dose de 1 ml par voie intramusculaire
- Ne vacciner que des animaux en bonne santé
- Mise en garde particulière :

En raison d'une interférence possible avec les anticorps d'origine maternelle, les poulains ne devraient pas être vaccinés avant l'âge de 6 mois, particulièrement s'ils sont nés de juments qui ont été vaccinés pendant les 2 derniers mois de gestation





EQUILIS PREQUENZA TE

- **Interactions :**

Aucune information n'est disponible concernant l'innocuité et l'efficacité lors de l'utilisation concomitante de ce vaccin avec d'autres vaccins. L'innocuité et l'efficacité de l'utilisation concomitante avec le sérum antitétanique d'Intervet ont été démontrées. Par conséquent, il est recommandé de n'administrer aucun autre vaccin simultanément ou en même temps.

- **Incompatibilités physiques ou chimiques :**

Ne pas mélanger à un autre vaccin ou produit immunologique

- **Précautions particulières pour l'utilisateur :**

En cas d'auto-injection accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

- **Précautions particulières pour l'environnement :**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Présentation :

Boite(s) carton de 10 seringues pré-remplies avec aiguilles

