



Nobilis SG 9R

Propriétés :

Nobilis SG 9R est un vaccin vivant lyophilisé contre la Typhose aviaire. Chaque dose de vaccin contient au moins 2×10^7 UFC de *Salmonella gallinarum* souche 9R. La pastille doit être reconstituée dans un diluant adéquat avant utilisation

Indications :

Immunisation active des poulets contre la Typhose aviaire à *Salmonella gallinarum* et les infections à *Salmonella enteritidis*.

Programme de vaccination :

La première vaccination peut s'effectuer à partir de 6 semaines d'âge.
Rappel maximum 12 semaines après.

Dans les régions où le risque de la Typhose aviaire est très élevé, des revaccinations peuvent être envisagées à des intervalles de 12 semaines.

Posologie :

Administrer à chaque poulet 0.2 ml du vaccin reconstitué, par injection sous-cutanée dans la région inférieure du cou.

Mode d'administration :

Reconstituer le vaccin avec un diluant adéquat, dans les conditions d'asepsie. Avec une seringue et une aiguille stériles, prélever une petite quantité de diluant, l'injecter dans le flacon de vaccin et agiter celui-ci pour assurer la mise en suspension complète du vaccin. Retirer le mélange du flacon et l'injecter dans le diluant restant. Cette procédure doit être répétée afin d'assurer un prélèvement complet du vaccin.

Conservation :

Entre +2 et +8°C, à l'abri de la lumière.

Précautions :

- Ne vacciner que des animaux sains.
- Les flacons doivent toujours être utilisés dans les 2 heures suivant la reconstitution.
- Utiliser un matériel d'injection stérile.
- L'utilisation d'antibiotiques ou d'autres substances ayant une action systémique doit être évitée dans les 7 jours qui précèdent la vaccination et les 14 jours qui suivent.
- En vue d'un développement optimal de l'immunité, il est conseillé de ne pas introduire de poulets dans un environnement infecté jusqu'au quinzième jour après la primo - vaccination.
- L'expérience a toutefois montré que la vaccination d'urgence de *Salmonella gallinarum* à un stade peut avancé de l'infection peut avoir un effet favorable.
- En cas d'auto-injection accidentelle d'un opérateur ou d'un assistant, une réaction localisée peut se manifester. Il est recommandé de consulter un médecin.

Présentation :

Flacon de 1000 doses. Boîte de 10 flacons

