



KETALGEN^{100mg} Ketoprofene

*Toute la puissance d'un Anti Inflammatoire
mais avec une biodisponibilité exceptionnelle*



*0 délai d'attente
dans le lait*



Rapidité d'Action



*Pharmavet
Maroc*

L'expertise fait la différence

> Ketalgen 100 Mg

Ketalgen 100 mg est à base de kétoprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) possédant des propriétés anti-inflammatoires, anti-exsudatives, analgésiques et antipyrétiques, Il agit par inhibition de la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes

> Indications du Ketalgen 100 Mg

Bovins

Ketalgen + antibiotiques	Traite	Mammites aiguës
Ketalgen	Soulage douleur	Système musculo-squelettique
Ketalgen	Soulage douleur	Post opératoire et empêche les tuméfactions

Equins

Ketalgen	Allège	Inflammations
Ketalgen	Soulage douleur	Système musculo-squelettique
Ketalgen	Soulage	colique

> Indications du Ketalgen 100 Mg

Bovins	IM ou IV	3ml/ 100kg PV Pendant 3 jours maximum
Equins	IV	1ml/ 45kg PV Pendant 3 à 5 jours

> Délai d'attente du Ketalgen 100 Mg

Lait (Bovins) = Zero jour

Viande et abats = 4 jours

KETALGEN 100mg
Solution injectable pour bovins et équins

COMPOSITION : Chaque ml contient 100mg Kétoprofène. **INDICATIONS** : **Bovins** : Traitement anti-inflammatoire et analgésique des affections du système musculo-squelettique et des mamelles. **Equins** : Traitement anti-inflammatoire et analgésique des affections ostéo-articulaires et musculo-squelettique. Traitement symptomatique analgésique des coliques et des douleurs et tuméfactions postopératoires. **ADMINISTRATION ET POSOLOGIE** : Bovins: Administration intramusculaire ou intraveineuse. 3 mg de kétoprofène/kg de poids vif, correspondant à 3 ml pour 100 kg de poids vif, une fois par jour pendant 1 à 3 jours. Equidés: Administration intraveineuse stricte. 2,2 mg de kétoprofène/kg de poids vif, soit 1 ml pour 45 kg de poids vif, une fois par jour pendant 3 à 5 jours. Une seconde injection peut être répétée en cas de récurrence de coliques. **TEMPS D'ATTENTE** : Viande et abats: 4 jours. Lait (bovins): Zéro jours. Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine. **PRESENTATIONS** : Flacon de 100 ml : AMM N° 1808.1/15. Flacon de 250 ml : AMM N° 1808.2/15. **CONTRE-INDICATIONS, EFFETS SECONDAIRES ET PRECAUTIONS** : Veuillez lire la notice avant utilisation. Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le délai d'attente du produit.