


Pharma

CYCLIC®

**Toute la force de la
D-Cloprosténol**



Pour une gestion optimale de la fertilité

-  **Vaches et Juments**
-  **Faible volume d'injection**
-  **Plusieurs indications**

Pharmavet
Maroc

L'expertise fait la différence

Faible volume d'injection

2 ml chez la Vache
1 ml chez la Jument

La cloprosténol dispose de 2 énantiomères : L cloprosténol et le D Cloprosténol; cette dernière est la forme biologiquement active.

La cloprosténol (D Cloprosténol) est le plus puissant analogue de synthèse de la prostaglandine F2 α : son effet luteolytique s'exerce à des faibles doses (volume)

Plusieurs indications chez plusieurs espèces



1 Synchronisation de l'oestrus et traitement du sub oestrus (chaleurs silencieuses)


1 Protocole PHARMACYCLIC



2 Protocole RECEPTAL - PHARMACYCLIC - RECEPTAL



3 Protocole CIDR - PHARMACYCLIC : vache / génisses cyclées et non cyclées



II Induction du velage



III Kyste Lutéal



IV Traitement des endométrites et pyomètres




V Interruption de la gestation

1 Mesailance



2 Induction de l'avortement





Induction de la lutéolyse chez des juments ayant un corps jaune fonctionnel.

- **Mortalité embryonnaire précoce et resorption tard dans la saison sexuelle (phase lutéale)**
- **Interruption de la pseudogestation.**
- **Traitement de l'anoestrus de lactation.**
- **Synchronisation de l'oestrus (Stud management) et traitement des chaleurs silencieuses (jument maiden)**



Pharma CYCLIC
Solution injectable
D-cloprosténol (forme active de Cloprosténol)

COMPOSITION : 1 ml contient 75 µg de D-cloprosténol (forme active de cloprosténol de sodium), Chlorocrésol 1mg, Excipients q.s.p. 1 ml. . **INDICATIONS:** Bovins (vache) : Synchronisation ou induction de l'oestrus ; Involution utérine retardée ; Induction de l'avortement au cours de la première moitié de la gestation ; Expulsion de fœtus momifiés ; Endométrite/pyomètre ; Induction de la parturition ; Dysfonctionnement ovarien (corps jaune persistant, kyste lutéal). Equins (jument) : Induction de la lutéolyse chez des juments présentant un corps jaune fonctionnel. **POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie intra musculaire stricte. **Chez la vache :** administrer 2 ml de produit, équivalent à 150 µg de substance active. Synchronisation de l'oestrus : administrer le produit deux fois en respectant un intervalle de 11 à 14 jours entre chaque dose. Procéder ensuite à deux inséminations artificielles à des intervalles de 72 à 96 heures à partir de la deuxième injection. Induction de l'oestrus (également chez les vaches aux chaleurs silencieuses ou discrètes) : Administrer le médicament après vérification de la présence du corps jaune. Si les chaleurs n'ont pas été observées suite à la première injection, il est nécessaire de pratiquer une seconde injection 11 à 14 jours après la première. Les animaux seront inséminés sur chaleurs observées ou deux fois à 72 et 96 heures après la seconde administration. Induction de la parturition après 270 jours de gestation : administrer le médicament après 270 jours de gestation. La mise bas a lieu généralement dans les 30 à 60 heures après le traitement. Kyste lutéal : lorsque la présence du corps jaune est établie, administrer le médicament puis inséminer au premier oestrus après l'injection. Si l'oestrus n'est pas évident, procéder à un examen gynécologique plus approfondi et répéter l'injection 11 à 14 jours après la première injection. L'insémination doit être toujours réalisée dans 72-96 heures après l'injection. Endométrite/pyomètre : administrer 1 dose de 2 ml du produit. si nécessaire renouveler le traitement 10 jours plus tard. Induction de l'avortement au cours de la première moitié de la gestation : administrer le produit au cours de la première moitié de la gestation (jusqu'à 150ème jours de la gestation). Expulsion de fœtus momifiés : administrer une dose de 2 ml du médicament. L'expulsion du fœtus est observée dans les 3 à 4 jours après l'administration du médicament. Involution utérine retardée : administrer le médicament et si nécessaire, effectuer un ou deux traitements successifs à 24 heures d'intervalle. **Chez la jument :** Induction de la lutéolyse chez des juments présentant un corps jaune fonctionnel : administrer 1 ml de médicament, équivalent à 75µg de substance active. **TEMPS D'ATTENTE :** Bovins : Viande et abats: Zéro jour. Lait (bovins): Zéro heure. Equins : Viande et abats: 2 jour. Lait (équins): Zéro heure. **PRESENTATIONS :** 1 flacon de 20 ml dans une boîte en carton. : AMM MAROC N° 1821.1/15. 5 flacons de 20 ml dans une boîte en carton. : AMM MAROC N° 1821.2/15. **CONTRE-INDICATIONS, EFFETS SECONDAIRES ET PRECAUTIONS :** Veuillez lire la notice avant utilisation.

Produit à usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le délai d'attente du produit